

# ALGUNOS CONSEJOS MÁS:




Los niños son especiales y tienen necesidades especiales. Si usted se encuentra al cuidado de un niño con gastrostomía, los siguientes puntos pueden ser de utilidad:

- A medida que el bebé crece su estómago se va agrandando, por lo que la cantidad de alimentación va en aumento
- El niño con gastrostomía también puede tener cólicos, puede vomitar y eructar
- Tienen las mismas necesidades de crecimiento y desarrollo que los demás niños
- Si el clima es cálido o tiene fiebre tendrá más necesidad de agua



- Es importante que participe en las comidas, que toque y saboree los alimentos (pregunte a su médico). Si está capacitado para comer por boca y así se lo ha dicho su médico, debe hacerlo.
- Mientras se alimente procure que no pierda la succión y ofrézcale el chupete, debe recibir estimulación oral
- El lactante debe ser abrazado y acariciado mientras come, le proporcionará seguridad y el cariño nunca es demasiado
- Es preciso conocer los signos de deshidratación ante un niño con vómitos, diarrea, fiebre etc; que son: debilidad, labios y boca seca, orina más escasa o concentrada (más oscura) , dolor de cabeza, irritabilidad, mareo. Pregunte a su médico cantidad máxima de agua diaria que le puede administrar.

**¡USE EL CHUPETE!**



Cuando se retire una sonda o botón de gastrostomía es suficiente con acercar los bordes del orificio mediante steri-strip (tiras pequeñas de un esparadrapo) para facilitar que se forme la cicatriz. Si tras 7-15 días no se ha cerrado, consultar con personal especializado

